

Tumorregister München



- ▶ Inzidenz und Mortalität
- ▶ Auswahlmatrix
- ▶ Homepage
- ▶ *English*

ICD-10 C34: Kleinzell. BC

Survival

Diagnosejahr	1988-1997	1998-2020
Patienten	304	846
Erkrankungen	304	847
Fälle in Auswertung	274	620
Erstellungsdatum	26.06.2024	
Datenbankexport	17.08.2022	
Population	5,16 Mio.	



Tumorregister München
an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München
Marchioninstr. 15
81377 München
Deutschland

<https://www.tumorregister-muenchen.de>

https://www.tumorregister-muenchen.de/facts/surv/sC34S_G-ICD-10-C34-Kleinzell.-BC-Survival.pdf

Index der Abbildungen und Tabellen

Abb./Tab.		Seite
1a	Relatives Überleben nach Diagnosezeitraum (Grafik)	3
1b	Überleben nach Diagnosezeitraum (Tabelle)	3
2a	Überleben nach Geschlecht (Grafik)	4
2b	Überleben nach Geschlecht (Tabelle)	4
3a	Beobachtetes Überleben nach Altersgruppe (Grafik)	5
3b	Relatives Überleben nach Altersgruppe (Grafik)	5
3c	Überleben nach Altersgruppe (Tabelle)	6
4a	Relatives Überleben nach UICC (Grafik)	7
4b	Überleben nach UICC (Tabelle)	7
4e	Relatives Überleben nach TNM-Kategorie (Grafik)	8
4f	Überleben nach TNM-Kategorie (Tabelle)	8
4i	Konditionales Überleben nach Tumorausbreitung (Grafik)	9
4j	Konditionales Überleben nach Tumorausbreitung (Tabelle)	9
5a	Zeit bis zur ersten Progression (CI) (Grafik)	10
5b	Zeit bis zur ersten Progression (Tabelle)	10
5c	Beobachtetes Überleben ab Progression (Grafik)	12
5d	Beobachtetes Überleben ab Progression (Tabelle)	12
5e	Beobachtetes Überleben ab Progression nach Zeitraum Progression (Grafik)	13
5f	Beobachtetes Überleben ab Progression nach Zeitraum Progression (Tabelle)	13




Abb. 1a. Relatives Überleben für Patienten mit Kleinzell. BC nach Diagnosezeitraum. In der Auswertung befinden sich 894 Patienten aus den Diagnosejahrgängen 1988 bis 2020.

Die farbigen Symbole repräsentieren zum Vergleich die Survival-Ergebnisse des SEER-Programms (Surveillance, Epidemiology, and End Results) des National Cancer Institute (NCI) der USA, zusammengefasst für die Diagnosejahrgänge 2000 bis 2019.

Eingeschlossen sind alle mit klinischen Daten registrierten Patienten, also keine DCO-Fälle. Die Daten ab 1998 haben mit dieser DCO-Einschränkung einen Bevölkerungsbezug. Die historischen Daten der vorausgehenden Perioden können stark selektiert sein, so dass univariate Vergleiche der dargestellten Zeitperioden nur mit Vorsicht zu interpretieren sind. Die verschiedenen Zeitperioden werden dennoch aufbereitet, um insbesondere den Langzeitverlauf des relativen Überlebens im Vergleich zu anderen Tumoren zugänglich zu machen.

Jahre	Diagnosezeitraum							
	1988-1997 n=274		1998-2006 n=234		2007-2017 n=320		ab 2018 n=66	
	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %
0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1	50.2	50.9	44.3	45.0	48.1	48.8	63.7	63.3
2	20.6	21.1	24.2	24.9	22.8	23.3		
3	13.4	13.7	15.4	15.7	14.6	15.0		
4	9.6	10.1	10.9	11.4	10.7	11.2		
5	8.4	8.9	9.1	9.5	8.7	9.0		
Median	1.0		0.9		1.0			

Tab. 1b. Beobachtetes (beob.) und relatives (rel.) Überleben für Patienten mit Kleinzell. BC nach Diagnosezeitraum im Zeitraum 1988-2020 (N=894).




Abb. 2a. Beobachtetes, erwartetes und relatives Überleben für Patienten mit Kleinzell. BC nach Geschlecht. In der Auswertung befinden sich 620 Patienten aus den Diagnosejahrgängen 1998 bis 2020.

Jahre	Geschlecht			
	Männlich n=370		Weiblich n=250	
	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %
0	100.0	100.0	100.0	100.0
1	45.2	46.0	52.7	53.2
2	22.6	23.3	30.6	31.1
3	13.0	13.3	20.8	21.1
4	9.5	10.0	14.9	15.4
5	8.1	8.6		
Median	0.9		1.1	

Tab. 2b. Beobachtetes (beob.) und relatives (rel.) Überleben für Patienten mit Kleinzell. BC nach Geschlecht im Zeitraum 1998-2020 (N=620).




Abb. 3a. Beobachtetes Überleben für Patienten mit Kleinzell. BC nach Altersgruppe. In der Auswertung befinden sich 620 Patienten aus den Diagnosejahrgängen 1998 bis 2020.




Abb. 3b. Relatives Überleben für Patienten mit Kleinzell. BC nach Altersgruppe. In der Auswertung befinden sich 620 Patienten aus den Diagnosejahrgängen 1998 bis 2020.

Jahre	Altersgruppe							
	< 50 J. n=61		50-59 J. n=136		60-69 J. n=269		>=70 J. n=154	
	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %
0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1	57.5	57.6	61.4	61.5	52.1	52.6	26.3	26.7
2	43.2	43.1	26.3	26.5	29.7	30.4		
3			19.1	18.7	16.8	17.3		
4					14.0	14.8		
5					11.9	12.4		
Median	1.5		1.2		1.1		0.7	

Tab. 3c. Beobachtetes (beob.) und relatives (rel.) Überleben für Patienten mit Kleinzell. BC nach Altersgruppe im Zeitraum 1998-2020 (N=620).




Abb. 4a. Relatives Überleben für Patienten mit Kleinzell. BC nach UICC. 539 von 620 Patienten aus den Diagnosejahrgängen 1998 bis 2020 besitzen Angaben zu diesem Merkmal, für 2 767 Personen wurde eine Klassifikation erstellt. Die graue Linie repräsentiert 179 Patienten ohne auswertbare Angaben zum Merkmal UICC (28,9 % von 620 Patienten, die übrigen Prozentangaben beziehen sich auf n=2 767).

Jahre	UICC					
	III n=41		IV n=380		k.A. n=179	
	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %
0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1	72.8	71.5	39.7	40.2	58.1	59.1
2	54.2	53.0	15.8	16.0	37.1	38.1
3			9.7	9.9	23.2	23.3
4					17.9	18.9
Median	2.2		0.8		1.3	

Tab. 4b. Beobachtetes (beob.) und relatives (rel.) Überleben für Patienten mit Kleinzell. BC nach UICC im Zeitraum 1998-2020 (N=441).




Abb. 4e. Relatives Überleben für Patienten mit Kleinzell. BC nach TNM-Kategorie. 539 von 620 Patienten aus den Diagnosejahrgängen 1998 bis 2020 besitzen Angaben zu diesem Merkmal, für 2 767 Personen wurde eine Klassifikation erstellt. Die Patienten können in mehreren Kategorien gezählt sein, daher ist die Summe der Prozentangaben größer als 100 %. Die graue Linie repräsentiert 93 Patienten ohne auswertbare Angaben zum Merkmal TNM-Kategorie (15,0 % von 620 Patienten, die übrigen Prozentangaben beziehen sich auf n=2 767).

Jahre	TNM-Kategorie													
	T1M0 n=20		T2M0 n=39		T3M0 n=31		T4M0 n=40		N+M0 n=127		M1 n=380		o.n.A. n=93	
	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %
0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1			87.2	87.9	73.3	73.2	72.1	70.8	74.3	74.6	39.7	40.2	38.2	39.1
2			60.6	61.8					53.6	54.8	15.8	16.0		
3									34.2	34.5	9.7	9.9		
4									27.7	28.5				
5									24.5	25.5				
Median									2.2		0.8		0.9	

Tab. 4f. Beobachtetes (beob.) und relatives (rel.) Überleben für Patienten mit Kleinzell. BC nach TNM-Kategorie im Zeitraum 1998-2020 (N=2 767).




Abb. 4i. Konditionales relatives 2 Jahres-Überleben für Patienten mit Kleinzell. BC nach Tumorausbreitung. 539 von 620 Patienten aus den Diagnosejahrgängen 1998 bis 2020 besitzen Angaben zu diesem Merkmal, für 538 Personen wurde eine Klassifikation erstellt. Die graue Linie repräsentiert 82 Patienten ohne auswertbare Angaben zum Merkmal Tumorausbreitung (13,2 % von 620 Patienten, die übrigen Prozentangaben beziehen sich auf n=538).

Jahre	Tumorausbreitung							
	Lokal		N+M0		M1		o.n.A.	
	n	Kond. Surv. % 2 J.	n	Kond. Surv. % 2 J.	n	Kond. Surv. % 2 J.	n	Kond. Surv. % 2 J.
0	24		134	53.4	380	16.0	82	
1			96	46.1	145	24.4		
2			64	53.2				
3			40	71.0				

Tab. 4j. Konditionales Überleben für Patienten mit Kleinzell. BC nach Tumorausbreitung im Zeitraum 1998-2020 (N=538).

Das konditionale relative Überleben repräsentiert die Überlebenswahrscheinlichkeit z.B. nach 2 oder 5 Jahren im Vergleich zur Normalbevölkerung (=100 %) unter der Bedingung, eine bestimmte Zeit nach Diagnose eines Tumors (x-Achse in Abb. 4g) überlebt zu haben. Damit wird eine Aussage möglich, wie sich das Risiko durch die Tumorerkrankung für ein bestimmtes Patientenkollektiv verringert. So beträgt beispielsweise für Patienten in der Untergruppe Tumorausbreitung=„N+M0“, die mindestens 3 Jahre nach Diagnose des Tumors am Leben sind, die konditionale relative 2 Jahres-Überlebensrate 71.0% (n=40).




Abb. 5a. Zeit bis zum ersten Progressionsereignis für 620 Patienten mit Kleinzell. BC aus den Diagnosejahrgängen 1998 bis 2020 (bei soliden Tumoren nur M0) geschätzt als kumulative Inzidenzfunktion (CI, durchgezogene Linie) mit Tod als konkurrierendes Risiko und als umgekehrter Kaplan-Meier-Schätzer (1-KM, gestrichelte Linie). Die Häufigkeit der Ereignisse kann aufgrund von Untererfassung unterschätzt sein.

	Progressionsform						
	Alle Progredienten (CI)	Alle Progredienten (1-KM)	Metastase (CI)	Metastase (1-KM)	Lokoreg. Rez. (CI)	Lokoreg. Rez. (1-KM)	Nicht spezifiziert (CI)
N	242	242	242	242	620	620	620
Events	196	196	143	143	59	59	107
konkurr. Jahre	7		56		490		451
	%	%	%	%	%	%	%
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	67.6	68.7	36.8	41.7	4.6	7.0	14.8
2	82.2	84.2	51.9	61.0	7.5	15.0	16.2
3			58.0	69.6	9.3	23.1	17.3
4			60.5	73.7	9.3	23.1	17.5
5			61.6	75.4	10.2	29.5	17.7
6			61.6	75.4	10.2	29.5	17.7
7					10.2	29.5	
8					10.2	29.5	

Progressionsform	
<i>Forts.</i>	Nicht spezifiziert (1-KM)
N	620
Events	107
konkurr.	
Jahre	%
0	0.0
1	18.8
2	22.6
3	28.3
4	29.6
5	32.0
6	32.0
7	
8	

Tab. 5b. Zeit bis zur ersten Progression (CI) für Patienten mit Kleinzell. BC im Zeitraum 1998-2020 (N=620) mit gesamter Anzahl von Progressionsereignissen (Events) und von Todesfällen als konkurrierendes Risiko (konkurr.).




Abb. 5c. Beobachtetes Überleben ab erster Progression für 534 Patienten mit Kleinzell. BC aus den Diagnosejahrgängen 1998 bis 2020. Diese 534 Patienten, für die ein klinischer Hinweis auf ein Progressionsereignis im Krankheitsverlauf vorliegt, entsprechen 86,1 % der 620 ausgewerteten Personen (einschl. M1, n=378, 61,0 %). Nicht berücksichtigt sind 59 Patienten (9,5 %), bei denen die Progression dem Register erst mit der Todesbescheinigung bekannt wurde. Mehrere Progressionsformen bei einem Patienten sind möglich, die auch in zeitlichem Abstand auftreten können. Die nicht spezifizierte Progression wird nur gezählt, wenn sie die erste oder die einzige Progressionsform im Verlauf ist.

Die Dokumentation besitzt häufig nicht die sprachliche Schärfe, um bei soliden Tumoren Lokalrezidive, regionäre Lymphknotenrezidive und Metastasen als Ereignisse unterscheiden zu können. Häufig ist auch „nicht spezifiziert“ zu registrieren. „Alle Progredienten“ sind Patienten, bei denen mindestens ein Ereignis im Krankheitsverlauf bekannt ist (einschl. primärer M1-Befunde). Die Anzahl der tatsächlichen Progressionen wird dabei unterschätzt. Lokalrezidive oder Metastasen sind Ereignisse, deren Summe größer als 100 % ist, weil mehrere Ereignisse im Verlauf auftreten können, ein Patient also in mehreren Kurven berücksichtigt werden kann.

Jahre	Progressionsform			
	Alle Progredienten n=534 %	Metastase n=484 %	Lokoreg. Rezidiv n=61 %	Nicht spezifiziert n=78 %
0	100.0	100.0	100.0	100.0
1	42.7	37.2	48.3	62.4
2	20.4	15.4		42.9
3	13.0	9.1		32.9
4	9.1			
5	7.1			

Tab. 5d. Beobachtetes Überleben ab erster Progression für Patienten mit Kleinzell. BC im Zeitraum 1998-2020 (N=534).




Abb. 5e. Beobachtetes Überleben ab erster Progression (Fernmetastase) für 628 Patienten mit Kleinzell. BC aus den Diagnosejahrgängen 1988 bis 2020 nach Zeitraum Progression.

Zeitraum Progression				
	1988-1997	1998-2006	2007-2017	ab 2018
	n=137	n=180	n=259	n=52
Jahre	%	%	%	%
0	100.0	100.0	100.0	100.0
1	16.5	32.6	36.2	56.1
2		16.0	11.3	
3			7.8	

Tab. 5f. Beobachtetes Überleben ab erster Progression (Fernmetastase) für Patienten mit Kleinzell. BC im Zeitraum 1988-2020 nach Zeitraum Progression (N=628).

Abkürzungen

TRM	Tumorregister München	
NCI	National Cancer Institute, USA	
SEER	Surveillance, Epidemiology, and End Results, USA	
UICC	Union for International Cancer Control, Genf	
DCO	Death certificate only	Diagnose ausschließlich aus Todesbescheinigung bekannt
k.A.	Keine Angabe	
o.n.A.	Ohne nähere Angabe	
OS	Overall/Observed Survival	Gesamtüberleben/beobachtetes Überleben (Kaplan-Meier-Schätzer) Beginn: Erstdiagnose Ereignis: Tod (alle Ursachen)
RS	Relative Survival	Relatives Überleben, relativ zur „Normalbevölkerung“, Quotient aus beobachtetem und zu erwartendem Überleben (Ederer II-Methode), Schätzung für das tumorspezifische Überleben
AS	Assembled Survival	Zusammengesetzte Darstellung des beobachteten, erwarteten, relativen Überlebens
CS	Conditional Survival	Konditionales Survival Überlebenswahrscheinlichkeit unter der Bedingung, einen bestimmten Zeitraum überlebt zu haben
TTP	Time to Progression	Zeit bis erste Progression Beginn: Erstdiagnose Ereignis (Progression): erste(s) Lokal-, Lymphknotenrezidiv, Metastase oder unspezifische Progression
1-KM		1 minus Kaplan-Meier-Schätzer („umgekehrter“ Kaplan-Meier-Schätzer)
CI		Kumulative Inzidenz Tod als konkurrierendes Ereignis (nach Kalbfleisch und Prentice)
PPS	Post-Progression Survival	Überleben ab erster Progression (Kaplan-Meier-Schätzer) Beginn (Progression): erste(s) Lokal-, Lymphknotenrezidiv, Metastase oder unspezifische Progression Ereignis: Tod (alle Ursachen)

Empfohlene Zitierweise

Tumorregister München. Überleben ICD-10 C34: Kleinzell. BC [Internet]. 2024 [aktualisiert 26.06.2024].
Abrufbar von: https://www.tumorregister-muenchen.de/facts/surv/sC34S_G-ICD-10-C34-Kleinzell.-BC-Survival.pdf

Autorenrechte

Der Zugang zu den vom Tumorregister München im offenen Internet bereitgestellten Inhalten ist weltweit verfügbar und kostenfrei. Die Dokumente dürfen unter Benennung der Urheberschaft frei heruntergeladen, genutzt, kopiert, gedruckt oder verteilt werden.

Haftungsausschluss

Das Tumorregister München übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der im Internet bereitgestellten Inhalte.