


# Tumorregister München



- ▶ Inzidenz und Mortalität
- ▶ Auswahlmatrix
- ▶ Homepage
- ▶ *English*

## ICD-10 C53: Zervixkarzinom

### Survival

Diagnosejahr	1988-1997	1998-2020
Patienten	272	1 016
Erkrankungen	272	1 018
Fälle in Auswertung	254	870
Erstellungsdatum	26.06.2024	
Datenbankexport	17.08.2022	
Population (Frauen)	2,61 Mio.	




Tumorregister München  
an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München  
Marchioninstr. 15  
81377 München  
Deutschland

<https://www.tumorregister-muenchen.de>

[https://www.tumorregister-muenchen.de/facts/surv/sC53\\_\\_G-ICD-10-C53-Zervixkarzinom-Survival.pdf](https://www.tumorregister-muenchen.de/facts/surv/sC53__G-ICD-10-C53-Zervixkarzinom-Survival.pdf)

**Index der Abbildungen und Tabellen**

Abb./Tab.		Seite
1a	Relatives Überleben nach Diagnosezeitraum (Grafik)	3
1b	Überleben nach Diagnosezeitraum (Tabelle)	3
2a	Überleben für das Gesamtkollektiv (Grafik)	4
2b	Überleben für das Gesamtkollektiv (Tabelle)	4
3a	Beobachtetes Überleben nach Altersgruppe (Grafik)	5
3b	Relatives Überleben nach Altersgruppe (Grafik)	5
3c	Überleben nach Altersgruppe (Tabelle)	6
4a	Relatives Überleben nach FIGO (Grafik)	7
4b	Überleben nach FIGO (Tabelle)	7
4c	Konditionales Überleben nach Tumorausbreitung (Grafik)	9
4d	Konditionales Überleben nach Tumorausbreitung (Tabelle)	9
5a	Zeit bis zur ersten Progression (CI) (Grafik)	10
5b	Zeit bis zur ersten Progression (Tabelle)	10
5c	Beobachtetes Überleben ab Progression (Grafik)	12
5d	Beobachtetes Überleben ab Progression (Tabelle)	12
5e	Beobachtetes Überleben ab Progression nach Zeitraum Progression (Grafik)	13
5f	Beobachtetes Überleben ab Progression nach Zeitraum Progression (Tabelle)	13




**Abb. 1a.** Relatives Überleben für Patienten mit Zervixkarzinom nach Diagnosezeitraum. In der Auswertung befinden sich 1 116 Patienten aus den Diagnosejahrgängen 1988 bis 2020.

Die farbigen Symbole repräsentieren zum Vergleich die Survival-Ergebnisse des SEER-Programms (Surveillance, Epidemiology, and End Results) des National Cancer Institute (NCI) der USA, zusammengefasst für die Diagnosejahrgänge 2000 bis 2019.

Eingeschlossen sind alle mit klinischen Daten registrierten Patienten, also keine DCO-Fälle. Die Daten ab 1998 haben mit dieser DCO-Einschränkung einen Bevölkerungsbezug. Die historischen Daten der vorausgehenden Perioden können stark selektiert sein, so dass univariate Vergleiche der dargestellten Zeitperioden nur mit Vorsicht zu interpretieren sind. Die verschiedenen Zeitperioden werden dennoch aufbereitet, um insbesondere den Langzeitverlauf des relativen Überlebens im Vergleich zu anderen Tumoren zugänglich zu machen.

Jahre	Diagnosezeitraum							
	1988-1997 n=254		1998-2006 n=286		2007-2017 n=464		ab 2018 n=112	
	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %
0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1	91.6	92.7	91.8	92.6	90.2	90.8	93.2	93.7
2	81.9	83.7	79.6	81.0	80.3	81.1	84.5	85.0
3	73.0	75.6	70.3	71.9	72.9	73.9		
4	67.6	70.6	66.6	68.4	67.2	68.5		
5	63.1	66.5	63.7	65.7	64.2	65.7		
6	61.4	65.4	59.3	61.6	62.5	64.2		
7	60.1	64.4	56.6	59.0	60.0	62.0		
8	57.9	62.9	54.8	57.7	58.3	60.6		
9	56.2	61.6	54.4	57.4	57.9	60.2		
10	53.0	58.7	53.2	56.6	57.0	59.8		
11	49.8	55.6	52.5	56.2	57.0	59.8		
12	48.9	54.8	51.3	55.2	55.2	58.7		
13	47.5	53.9	50.1	54.3	55.2	57.8		
14	46.1	52.6	47.4	52.1				
15	44.7	51.5	46.5	51.2				
Median	10.8		13.0					


**Tab. 1b.** Beobachtetes (beob.) und relatives (rel.) Überleben für Patienten mit Zervixkarzinom nach Diagnosezeitraum im Zeitraum 1988-2020 (N=1 116).




**Abb. 2a.** Beobachtetes, erwartetes und relatives Überleben für das Gesamtkollektiv mit Zervixkarzinom. In der Auswertung befinden sich 862 Patienten aus den Diagnosejahrgängen 1998 bis 2020.

Gruppe		
Alle Patienten n=862		
Jahre	beob. %	rel. %
0	100.0	100.0
1	91.2	91.8
2	80.5	81.6
3	72.3	73.7
4	67.5	69.0
5	64.4	66.3
6	61.6	63.6
7	59.0	61.3
8	57.2	59.8
9	56.8	59.6
10	55.7	58.9
11	55.2	58.7
12	53.8	57.6
13	52.9	57.1
14	50.1	54.7
15	49.2	53.8
Median	14.7	

**Tab. 2b.** Beobachtetes (beob.) und relatives (rel.) Überleben für das Gesamtkollektiv mit Zervixkarzinom im Zeitraum 1998-2020 (N=862).




**Abb. 3a.** Beobachtetes Überleben für Patienten mit Zervixkarzinom nach Altersgruppe. In der Auswertung befinden sich 862 Patienten aus den Diagnosejahrgängen 1998 bis 2020.



**Abb. 3b.** Relatives Überleben für Patienten mit Zervixkarzinom nach Altersgruppe. In der Auswertung befinden sich 862 Patienten aus den Diagnosejahrgängen 1998 bis 2020.

Jahre	Altersgruppe									
	< 35 J. n=109		35-49 J. n=352		50-59 J. n=199		60-69 J. n=114		>=70 J. n=88	
	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %
0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1	100.0	99.1	93.9	94.0	91.3	91.2	85.1	85.4	77.0	80.4
2	91.8	91.0	86.2	86.4	77.1	77.5	74.3	75.4	59.9	64.7
3	84.1	83.5	80.7	80.8	67.6	68.4	64.6	65.8	45.5	51.9
4	80.5	80.6	77.0	77.2	61.1	61.8	56.0	57.3	42.8	49.6
5	80.5	79.9	75.9	76.0	57.3	58.0	50.0	52.1	34.4	42.5
6	80.5	79.2	72.9	73.2	55.2	56.2	45.0	47.2	30.1	39.0
7	79.1	78.8	71.7	72.1	53.0	54.3	38.6	40.1		
8	79.1	78.3	70.4	71.1	51.4	53.0	33.4	36.0		
9	79.1	77.8	69.9	70.4	50.5	52.0	33.4	35.4		
10	79.1	77.3	69.4	70.2	48.5	50.7	30.7	33.3		
11	79.1	76.8	68.8	70.0	48.5	50.6				
12	79.1	76.3	68.2	69.0	47.2	50.4				
13			67.5	68.5	47.2	50.2				
14			65.0	66.8	47.2	50.1				
15			65.0	66.3	43.6	47.9				
Median					9.1		4.9		2.8	

**Tab. 3c.** Beobachtetes (beob.) und relatives (rel.) Überleben für Patienten mit Zervixkarzinom nach Altersgruppe im Zeitraum 1998-2020 (N=862).




**Abb. 4a.** Relatives Überleben für Patienten mit Zervixkarzinom nach FIGO. 812 von 862 Patienten aus den Diagnosejahren 1998 bis 2020 besitzen Angaben zu diesem Merkmal, für 3 328 Personen wurde eine Klassifikation erstellt. Die graue Linie repräsentiert 217 Patienten ohne auswertbare Angaben zum Merkmal FIGO (25,2 % von 862 Patienten, die übrigen Prozentangaben beziehen sich auf n=3 328).

Jahre	FIGO													
	IA1 n=53		IB n=21		IB1 n=210		IB2 n=64		IIA n=21		IIB n=96		IVB n=135	
	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %
0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1	100.0	98.5	100.0	97.8	99.0	99.0	90.2	90.3	100.0	97.6	98.9	99.1	75.4	75.8
2	97.9	98.0			97.5	98.0	83.2	82.9			90.3	90.6	50.6	50.9
3	97.9	97.8			94.5	94.9	77.6	77.0			79.7	81.2	35.1	34.9
4	97.9	97.6			90.2	91.0	71.6	72.2			77.3	79.0	27.2	27.3
5	97.9	97.4			87.9	88.9	71.6	71.3			72.1	73.7	21.9	22.2
6	97.9	97.2			85.5	86.6	69.3	68.9			61.4	64.0		
7	97.9	97.0			84.2	85.7	64.7	64.6			56.1	59.2		
8	94.9	95.6			82.2	84.2	62.2	63.8			56.1	58.7		
9	94.9	94.1			80.6	82.9	62.2	63.5			56.1	58.3		
10	91.0	91.8			80.6	82.9	62.2	63.2			52.5	55.6		
Median											11.0		2.0	

FIGO		
Forts.	o.n.A. n=217	
Jahre	beob. %	rel. %
0	100.0	100.0
1	87.2	88.4
2	72.4	74.0
3	59.9	62.1
4	53.5	55.4
5	51.5	53.9
6	49.3	51.7
7	44.4	46.7
8	40.8	44.0
9	40.8	44.0
10	40.8	44.0
Median	5.6	

**Tab. 4b.** Beobachtetes (beob.) und relatives (rel.) Überleben für Patienten mit Zervixkarzinom nach FIGO im Zeitraum 1998-2020 (N=645).




**Abb. 4c.** Konditionales relatives 5 Jahres-Überleben für Patienten mit Zervixkarzinom nach Tumorausbreitung. 812 von 862 Patienten aus den Diagnosejahrgängen 1998 bis 2020 besitzen Angaben zu diesem Merkmal, für 809 Personen wurde eine Klassifikation erstellt. Die graue Linie repräsentiert 53 Patienten ohne auswertbare Angaben zum Merkmal Tumorausbreitung (6,1 % von 862 Patienten, die übrigen Prozentangaben beziehen sich auf n=809).

Jahre	Tumorausbreitung							
	Lokal		N+M0		M1		o.n.A.	
	n	Kond. Surv. % 5 J.	n	Kond. Surv. % 5 J.	n	Kond. Surv. % 5 J.	n	Kond. Surv. % 5 J.
0	486	78.8	188	66.6	135	22.2	53	60.0
1	441	80.2	172	65.7			46	62.7
2	384	83.4	142	68.5			38	71.2
3	340	87.5	121	71.5				
4	306	90.3	100	77.7				
5	281	92.2	88	80.2				
6	259	95.0	76	85.1				
7	234	94.5	64	92.5				
8	213	94.9	54	95.9				
9	194	93.4	48	89.0				
10	173	93.5	42	87.2				

**Tab. 4d.** Konditionales Überleben für Patienten mit Zervixkarzinom nach Tumorausbreitung im Zeitraum 1998-2020 (N=809).

Das konditionale relative Überleben repräsentiert die Überlebenswahrscheinlichkeit z.B. nach 2 oder 5 Jahren im Vergleich zur Normalbevölkerung (=100 %) unter der Bedingung, eine bestimmte Zeit nach Diagnose eines Tumors (x-Achse in Abb. 4a) überlebt zu haben. Damit wird eine Aussage möglich, wie sich das Risiko durch die Tumorerkrankung für ein bestimmtes Patientenkollektiv verringert. So beträgt beispielsweise für Patienten in der Untergruppe Tumorausbreitung=„Lokal“, die mindestens 3 Jahre nach Diagnose des Tumors am Leben sind, die konditionale relative 5 Jahres-Überlebensrate 87.5% (n=340).




**Abb. 5a.** Zeit bis zum ersten Progressionsereignis für 858 Patienten mit Zervixkarzinom aus den Diagnosejahrgängen 1998 bis 2020 (bei soliden Tumoren nur M0) geschätzt als kumulative Inzidenzfunktion (CI, durchgezogene Linie) mit Tod als konkurrierendes Risiko und als umgekehrter Kaplan-Meier-Schätzer (1-KM, gestrichelte Linie). Die Häufigkeit der Ereignisse kann aufgrund von Untererfassung unterschätzt sein.

	Progressionsform							
	Alle Progredienten (CI)	Alle Progredienten (1-KM)	Lokalrezidiv (CI)	Lokalrezidiv (1-KM)	Lk.-Rezidiv (CI)	Lk.-Rezidiv (1-KM)	Metastase (CI)	Metastase (1-KM)
N	723	723	858	858	858	858	858	723
Events	299	299	147	147	60	60	207	207
konkurr. Jahre	52		261		313		85	
	%	%	%	%	%	%	%	%
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	21.2	21.4	6.2	6.5	1.7	1.7	10.8	10.8
2	31.2	31.4	12.4	13.5	3.7	4.1	19.3	19.3
3	35.8	36.2	14.2	15.8	5.0	5.8	23.5	23.5
4	37.8	38.2	15.5	17.5	5.7	6.8	26.0	26.0
5	39.8	40.4	16.9	19.5	6.3	7.6	27.2	27.2
6	40.7	41.3	17.5	20.4	6.8	8.3	28.3	28.3
7	42.2	42.9	18.2	21.3	7.0	8.6	29.5	29.5
8	42.2	42.9	18.2	21.3	7.0	8.6	29.7	29.7
9	42.6	43.4	18.2	21.3	7.4	9.3	30.1	30.1
10	42.9	43.7	18.2	21.3	7.4	9.3	30.4	30.4
11	43.7	44.5	18.2	21.3	7.6	9.7	31.5	31.5
12	44.5	45.5	18.4	21.8	8.1	10.6	31.8	31.8
13	44.5	45.5	18.4	21.8	8.1	10.6	32.1	32.1
14	44.9	46.0	18.4	21.8	8.5	11.2	32.1	32.1
15	45.8	47.1	19.2	23.2	8.5	11.2	32.6	32.6

Forts.	Progressionsform		
	Metastase (1-KM)	Nicht spezifiziert (CI)	Nicht spezifiziert (1- KM)
N	723	858	858
Events	207	73	73
konkurr.		304	
Jahre	%	%	%
0	0.0	0.0	0.0
1	10.9	7.6	7.8
2	19.7	8.4	8.6
3	24.2	8.5	8.8
4	26.9	8.5	8.8
5	28.2	8.5	8.8
6	29.5	8.5	8.8
7	30.8	8.7	9.1
8	31.0	8.7	9.1
9	31.5	8.7	9.1
10	31.8	8.7	9.1
11	33.1	8.7	9.1
12	33.5	8.7	9.1
13	33.9	8.7	9.1
14	33.9	8.7	9.1
15	34.5	8.7	9.1

**Tab. 5b.** Zeit bis zur ersten Progression (CI) für Patienten mit Zervixkarzinom im Zeitraum 1998-2020 (N=858) mit gesamtter Anzahl von Progressionsereignissen (Events) und von Todesfällen als konkurrierendes Risiko (konkurr.).




**Abb. 5c.** Beobachtetes Überleben ab erster Progression für 412 Patienten mit Zervixkarzinom aus den Diagnosejahrgängen 1998 bis 2020. Diese 412 Patienten, für die ein klinischer Hinweis auf ein Progressionsereignis im Krankheitsverlauf vorliegt, entsprechen 48,0 % der 858 ausgewerteten Personen (einschl. M1, n=135, 15,7 %). Nicht berücksichtigt sind 26 Patienten (3,0 %), bei denen die Progression dem Register erst mit der Todesbescheinigung bekannt wurde. Mehrere Progressionsformen bei einem Patienten sind möglich, die auch in zeitlichem Abstand auftreten können. Die nicht spezifizierte Progression wird nur gezählt, wenn sie die erste oder die einzige Progressionsform im Verlauf ist.

Die Dokumentation besitzt häufig nicht die sprachliche Schärfe, um bei soliden Tumoren Lokalrezidive, regionäre Lymphknotenrezidive und Metastasen als Ereignisse unterscheiden zu können. Häufig ist auch „nicht spezifiziert“ zu registrieren. „Alle Progredienten“ sind Patienten, bei denen mindestens ein Ereignis im Krankheitsverlauf bekannt ist (einschl. primärer M1-Befunde). Die Anzahl der tatsächlichen Progressionen wird dabei unterschätzt. Lokalrezidive oder Metastasen sind Ereignisse, deren Summe größer als 100 % ist, weil mehrere Ereignisse im Verlauf auftreten können, ein Patient also in mehreren Kurven berücksichtigt werden kann.

Jahre	Progressionsform				
	Alle Progredienten n=412 %	Lokalrezidiv n=150 %	Lk.-Rezidiv n=61 %	Metastase n=311 %	Nicht spezifiziert n=64 %
0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1	69.7	68.0	70.9	65.1	74.9
2	49.7	46.3	48.2	43.4	61.0
3	38.9	37.1		31.4	53.2
4	32.9	34.7		25.0	48.8
5	29.6	32.1		20.0	48.8
6	27.1			18.9	
7	25.2			18.3	
8	24.6			17.4	
9	24.6				
10	23.2				

**Tab. 5d.** Beobachtetes Überleben ab erster Progression für Patienten mit Zervixkarzinom im Zeitraum 1998-2020 (N=412).



**Abb. 5e.** Beobachtetes Überleben ab erster Progression (Fernmetastase) für 357 Patienten mit Zervixkarzinom aus den Diagnosejahrgängen 1988 bis 2020 nach Zeitraum Progression.

Jahre	Zeitraum Progression			
	1988-1997 n=33 %	1998-2006 n=77 %	2007-2017 n=197 %	ab 2018 n=50 %
0	100.0	100.0	100.0	100.0
1		56.2	64.4	78.1
2		28.1	44.6	
3			32.2	
4			25.7	
5			21.1	
6			20.3	
7			19.3	

**Tab. 5f.** Beobachtetes Überleben ab erster Progression (Fernmetastase) für Patienten mit Zervixkarzinom im Zeitraum 1988-2020 nach Zeitraum Progression (N=357).

**Abkürzungen**

TRM	Tumorregister München	
NCI	National Cancer Institute, USA	
SEER	Surveillance, Epidemiology, and End Results, USA	
UICC	Union for International Cancer Control, Genf	
DCO	Death certificate only	Diagnose ausschließlich aus Todesbescheinigung bekannt
k.A.	Keine Angabe	
o.n.A.	Ohne nähere Angabe	
OS	Overall/Observed Survival	Gesamtüberleben/beobachtetes Überleben (Kaplan-Meier-Schätzer) Beginn: Erstdiagnose Ereignis: Tod (alle Ursachen)
RS	Relative Survival	Relatives Überleben, relativ zur „Normalbevölkerung“, Quotient aus beobachtetem und zu erwartendem Überleben (Ederer II-Methode), Schätzung für das tumorspezifische Überleben
AS	Assembled Survival	Zusammengesetzte Darstellung des beobachteten, erwarteten, relativen Überlebens
CS	Conditional Survival	Konditionales Survival Überlebenswahrscheinlichkeit unter der Bedingung, einen bestimmten Zeitraum überlebt zu haben
TTP	Time to Progression	Zeit bis erste Progression Beginn: Erstdiagnose Ereignis (Progression): erste(s) Lokal-, Lymphknotenrezidiv, Metastase oder unspezifische Progression
1-KM		1 minus Kaplan-Meier-Schätzer („umgekehrter“ Kaplan-Meier-Schätzer)
CI		Kumulative Inzidenz Tod als konkurrierendes Ereignis (nach Kalbfleisch und Prentice)
PPS	Post-Progression Survival	Überleben ab erster Progression (Kaplan-Meier-Schätzer) Beginn (Progression): erste(s) Lokal-, Lymphknotenrezidiv, Metastase oder unspezifische Progression Ereignis: Tod (alle Ursachen)

**Empfohlene Zitierweise**

Tumorregister München. Überleben ICD-10 C53: Zervixkarzinom [Internet]. 2024 [aktualisiert 26.06.2024].  
Abrufbar von: [https://www.tumorregister-muenchen.de/facts/surv/sC53\\_\\_G-ICD-10-C53-Zervixkarzinom-Survival.pdf](https://www.tumorregister-muenchen.de/facts/surv/sC53__G-ICD-10-C53-Zervixkarzinom-Survival.pdf)

**Autorenrechte**

Der Zugang zu den vom Tumorregister München im offenen Internet bereitgestellten Inhalten ist weltweit verfügbar und kostenfrei. Die Dokumente dürfen unter Benennung der Urheberschaft frei heruntergeladen, genutzt, kopiert, gedruckt oder verteilt werden.

**Haftungsausschluss**

Das Tumorregister München übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der im Internet bereitgestellten Inhalte.