

# Tumorregister München



- ▶ Inzidenz und Mortalität
- ▶ Auswahlmatrix
- ▶ Homepage
- ▶ *English*

## ICD-10 C83.3: Diff. großzell. B-Zell-Lymphom

### Survival

Diagnosejahr	1988-1997	1998-2020
Patienten	248	1 167
Erkrankungen	248	1 167
Fälle in Auswertung	217	873
Erstellungsdatum	23.07.2024	
Datenbankexport	17.08.2022	
Population	5,16 Mio.	




Tumorregister München  
an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München  
Marchioninstr. 15  
81377 München  
Deutschland

<https://www.tumorregister-muenchen.de>

[https://www.tumorregister-muenchen.de/facts/surv/sC833\\_G-ICD-10-C83.3-Diff.-grosszell.-B-Zell-Lymphom-Survival.pdf](https://www.tumorregister-muenchen.de/facts/surv/sC833_G-ICD-10-C83.3-Diff.-grosszell.-B-Zell-Lymphom-Survival.pdf)

**Index der Abbildungen und Tabellen**

Abb./Tab.		Seite
1a	Relatives Überleben nach Diagnosezeitraum (Grafik)	3
1b	Überleben nach Diagnosezeitraum (Tabelle)	3
2a	Überleben nach Geschlecht (Grafik)	4
2b	Überleben nach Geschlecht (Tabelle)	4
2c	Konditionales Überleben nach Geschlecht (Grafik)	5
2d	Konditionales Überleben nach Geschlecht (Tabelle)	5
3a	Beobachtetes Überleben nach Altersgruppe (Grafik)	6
3b	Relatives Überleben nach Altersgruppe (Grafik)	6
3c	Überleben nach Altersgruppe (Tabelle)	7
4a	Relatives Überleben nach Ann-Arbor-Stadium (Grafik)	8
4b	Überleben nach Ann-Arbor-Stadium (Tabelle)	8
5a	Zeit bis zur ersten Progression (CI) (Grafik)	9
5b	Zeit bis zur ersten Progression (Tabelle)	9
5c	Beobachtetes Überleben ab Progression (Grafik)	10
5d	Beobachtetes Überleben ab Progression (Tabelle)	10
5e	Beobachtetes Überleben ab Progression nach Zeitraum Progression (Grafik)	11
5f	Beobachtetes Überleben ab Progression nach Zeitraum Progression (Tabelle)	11




**Abb. 1a.** Relatives Überleben für Patienten mit Diff. großzell. B-Zell-Lymphom nach Diagnosezeitraum. In der Auswertung befinden sich 1 090 Patienten aus den Diagnosejahrgängen 1988 bis 2020.

Die farbigen Symbole repräsentieren zum Vergleich die Survival-Ergebnisse des SEER-Programms (Surveillance, Epidemiology, and End Results) des National Cancer Institute (NCI) der USA, zusammengefasst für die Diagnosejahrgänge 2000 bis 2019.

Eingeschlossen sind alle mit klinischen Daten registrierten Patienten, also keine DCO-Fälle. Die Daten ab 1998 haben mit dieser DCO-Einschränkung einen Bevölkerungsbezug. Die historischen Daten der vorausgehenden Perioden können stark selektiert sein, so dass univariate Vergleiche der dargestellten Zeitperioden nur mit Vorsicht zu interpretieren sind. Die verschiedenen Zeitperioden werden dennoch aufbereitet, um insbesondere den Langzeitverlauf des relativen Überlebens im Vergleich zu anderen Tumoren zugänglich zu machen.

Jahre	Diagnosezeitraum					
	1988-1997 n=217		1998-2006 n=381		ab 2007 n=492	
	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %
0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1	77.9	79.3	83.1	84.9	77.1	78.9
2	67.4	70.0	73.7	76.7	68.5	71.6
3	58.8	62.0	69.6	73.6	63.8	67.8
4	54.4	57.9	67.7	72.8	59.2	64.7
5	49.9	54.3	65.5	71.9	55.7	62.0
6	47.5	52.8	62.7	70.0	52.5	59.7
7	46.5	52.7	60.1	68.7	50.2	58.2
8	42.4	48.9	58.4	68.0	46.0	54.8
9	40.9	47.8	56.4	66.9	42.7	51.8
10	39.8	47.3	53.8	65.3	39.9	49.5
11	38.8	46.5	51.8	63.9	37.5	47.4
12	38.2	46.5	49.1	62.0	35.8	45.8
13	36.0	44.6	48.2	61.8		
14	34.4	43.5	45.5	59.8		
15	32.7	42.5	42.4	56.8		
Median	4.9		11.5		7.0	


**Tab. 1b.** Beobachtetes (beob.) und relatives (rel.) Überleben für Patienten mit Diff. großzell. B-Zell-Lymphom nach Diagnosezeitraum im Zeitraum 1988-2020 (N=1 090).



**Abb. 2a.** Beobachtetes, erwartetes und relatives Überleben für Patienten mit Diff. großzell. B-Zell-Lymphom nach Geschlecht. In der Auswertung befinden sich 873 Patienten aus den Diagnosejahrgängen 1998 bis 2020.

Jahre	Geschlecht			
	Männlich n=479		Weiblich n=394	
	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %
0	100.0	100.0	100.0	100.0
1	79.7	81.6	79.8	81.4
2	69.6	72.8	72.3	74.9
3	65.4	69.7	67.5	71.2
4	62.8	68.7	63.4	68.1
5	59.6	66.7	61.0	66.4
6	57.0	65.1	57.5	63.8
7	53.8	63.1	56.1	63.3
8	51.3	61.4	53.0	61.1
9	47.1	57.8	52.7	61.5
10	44.3	55.5	50.3	60.3
11	42.2	53.9	48.3	58.7
12	39.9	52.2	46.0	57.3
13	38.6	51.1	45.6	57.5
14	36.7	50.1	42.9	55.5
15	35.2	48.5	39.2	51.8
Median	8.4		10.2	

**Tab. 2b.** Beobachtetes (beob.) und relatives (rel.) Überleben für Patienten mit Diff. großzell. B-Zell-Lymphom nach Geschlecht im Zeitraum 1998-2020 (N=873).




**Abb. 2c.** Konditionales relatives 2 / 5 Jahres-Überleben für Patienten mit Diff. großzell. B-Zell-Lymphom nach Geschlecht. 873 von 873 Patienten aus den Diagnosejahrgängen 1998 bis 2020 besitzen Angaben zu diesem Merkmal.


Jahre	Geschlecht					
	Männlich			Weiblich		
	n	Kond. Surv. %		n	Kond. Surv. %	
		2 J.	5 J.		2 J.	5 J.
0	479	72.8	66.7	394	74.9	66.4
1	369	85.6	80.1	303	87.4	78.5
2	301	94.5	87.2	260	90.8	84.7
3	280	95.6	88.6	238	93.4	86.3
4	262	95.3	85.4	211	94.1	91.2
5	236	95.3	84.7	197	95.4	91.7
6	217	95.1	84.5	177	96.3	93.5
7	197	92.8	85.0	164	97.6	92.1
8	179	91.5	85.5	145	99.6	96.6
9	155	94.6	89.2	140	96.3	92.6
10	133	95.4	90.0	125	96.7	89.1

**Tab. 2d.** Konditionales Überleben für Patienten mit Diff. großzell. B-Zell-Lymphom nach Geschlecht im Zeitraum 1998-2020 (N=873).

Das konditionale relative Überleben repräsentiert die Überlebenschance z.B. nach 2 oder 5 Jahren im Vergleich zur Normalbevölkerung (=100 %) unter der Bedingung, eine bestimmte Zeit nach Diagnose eines Tumors (x-Achse in Abb. 2a) überlebt zu haben. Damit wird eine Aussage möglich, wie sich das Risiko durch die Tumorerkrankung für ein bestimmtes Patientenkollektiv verringert. So beträgt beispielsweise für Patienten in der Untergruppe Geschlecht=„Männlich“, die mindestens 3 Jahre nach Diagnose des Tumors am Leben sind, die konditionale relative 2 Jahres-Überlebensrate 95.6% (n=280).




**Abb. 3a.** Beobachtetes Überleben für Patienten mit Diff. großzell. B-Zell-Lymphom nach Altersgruppe. In der Auswertung befinden sich 873 Patienten aus den Diagnosejahrgängen 1998 bis 2020.



**Abb. 3b.** Relatives Überleben für Patienten mit Diff. großzell. B-Zell-Lymphom nach Altersgruppe. In der Auswertung befinden sich 873 Patienten aus den Diagnosejahrgängen 1998 bis 2020.

Jahre	Altersgruppe									
	< 50 J. n=214		50-59 J. n=161		60-69 J. n=187		70-79 J. n=210		>=80 J. n=101	
	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %
0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1	87.2	87.1	87.3	87.7	81.0	82.0	73.6	75.7	62.5	68.1
2	81.2	81.3	75.9	76.7	74.3	75.9	66.4	70.6	43.0	51.6
3	80.1	80.4	73.9	74.6	69.6	72.4	57.3	63.2	37.5	49.9
4	77.9	78.2	71.8	73.4	66.0	69.7	52.4	60.2	34.1	52.0
5	76.2	76.6	70.3	72.4	63.0	67.5	47.8	57.4	30.5	53.2
6	75.7	75.8	67.2	69.7	58.4	63.7	43.6	55.5	28.0	54.5
7	73.8	74.6	66.4	69.4	55.0	61.1	41.7	55.6		
8	73.2	73.7	66.4	69.4	53.6	61.0	34.8	50.1		
9	71.8	72.8	62.9	67.0	52.1	60.6	31.9	48.9		
10	71.1	72.3	59.3	63.8	49.0	58.8	27.0	45.4		
Median			15.8		9.6		4.4		1.6	


**Tab. 3c.** Beobachtetes (beob.) und relatives (rel.) Überleben für Patienten mit Diff. großzell. B-Zell-Lymphom nach Altersgruppe im Zeitraum 1998-2020 (N=873).



**Abb. 4a.** Relatives Überleben für Patienten mit Diff. großzell. B-Zell-Lymphom nach Ann-Arbor-Stadium. 576 von 873 Patienten aus den Diagnosejahrgängen 1998 bis 2020 besitzen Angaben zu diesem Merkmal, für 873 Personen wurde eine Klassifikation erstellt. Die graue Linie repräsentiert 297 Patienten ohne auswertbare Angaben zum Merkmal Ann-Arbor-Stadium (34,0 % von 873 Patienten, die übrigen Prozentangaben beziehen sich auf n=873).

Jahre	Ann-Arbor-Stadium									
	I n=140		II n=162		III n=116		IV n=158		o.n.A. n=297	
	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %
0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1	97.0	98.5	87.5	89.1	83.4	85.2	78.3	79.1	66.6	68.4
2	89.3	92.2	82.3	85.0	77.0	80.4	63.2	64.8	57.4	60.3
3	85.2	89.1	78.8	83.1	72.3	77.3	56.7	59.0	53.4	57.5
4	83.6	89.3	75.3	80.6	67.4	73.5	53.7	56.5	50.0	55.5
5	82.7	89.4	71.6	78.7	64.4	72.2	52.1	55.0	46.0	52.3
6	79.3	87.5	69.3	77.3	60.4	68.8	49.6	53.2	43.0	50.0
7	75.7	85.0	66.2	75.9	58.4	67.7	48.7	52.8	40.8	48.6
8	74.8	85.1	63.0	73.2	53.8	64.6	45.9	50.3	37.9	46.9
9	71.1	82.3	62.1	73.3	50.2	62.3	44.9	50.0	34.7	43.5
10	67.4	79.6	60.3	73.2	47.7	59.9	42.8	48.1	31.6	41.3
Median	16.3		17.4		9.4		5.6		3.9	


**Tab. 4b.** Beobachtetes (beob.) und relatives (rel.) Überleben für Patienten mit Diff. großzell. B-Zell-Lymphom nach Ann-Arbor-Stadium im Zeitraum 1998-2020 (N=576).



**Abb. 5a.** Zeit bis zum ersten Progressionsereignis für 872 Patienten mit Diff. großzell. B-Zell-Lymphom aus den Diagnosejahrgängen 1998 bis 2020 (bei soliden Tumoren nur M0) geschätzt als kumulative Inzidenzfunktion (CI, durchgezogene Linie) mit Tod als konkurrierendes Risiko und als umgekehrter Kaplan-Meier-Schätzer (1-KM, gestrichelte Linie). Die Häufigkeit der Ereignisse kann aufgrund von Untererfassung unterschätzt sein.

	Progressionsform	
	Alle Progredienten (CI)	Alle Progredienten (1-KM)
N	872	872
Events	523	523
konkurr.	80	
Jahre	%	%
0	0.0	0.0
1	45.3	45.9
2	52.9	53.7
3	56.3	57.3
4	57.8	58.9
5	58.9	60.1
6	60.2	61.6
7	60.7	62.2
8	61.2	62.7
9	61.6	63.3
10	61.8	63.5

**Tab. 5b.** Zeit bis zur ersten Progression (CI) für Patienten mit Diff. großzell. B-Zell-Lymphom im Zeitraum 1998-2020 (N=872) mit gesamter Anzahl von Progressionsereignissen (Events) und von Todesfällen als konkurrierendes Risiko (konkurr.).




**Abb. 5c.** Beobachtetes Überleben ab erster Progression für 425 Patienten mit Diff. großzell. B-Zell-Lymphom aus den Diagnosejahrgängen 1998 bis 2020. Diese 425 Patienten, für die ein klinischer Hinweis auf ein Progressionsereignis im Krankheitsverlauf vorliegt, entsprechen 48,7 % der 872 ausgewerteten Personen. Nicht berücksichtigt sind 108 Patienten (12,4 %), bei denen die Progression dem Register erst mit der Todesbescheinigung bekannt wurde.

Die Dokumentation besitzt häufig nicht die sprachliche Schärfe, um bei soliden Tumoren Lokalrezidive, regionäre Lymphknotenrezidive und Metastasen als Ereignisse unterscheiden zu können. Häufig ist auch „nicht spezifiziert“ zu registrieren. „Alle Progredienten“ sind Patienten, bei denen mindestens ein Ereignis im Krankheitsverlauf bekannt ist (einschl. primärer M1-Befunde). Die Anzahl der tatsächlichen Progressionen wird dabei unterschätzt. Lokalrezidive oder Metastasen sind Ereignisse, deren Summe größer als 100 % ist, weil mehrere Ereignisse im Verlauf auftreten können, ein Patient also in mehreren Kurven berücksichtigt werden kann.

Progressionsform	
Alle Progredienten n=425	
Jahre	%
0	100.0
1	69.2
2	59.2
3	54.2
4	51.9
5	47.9
6	44.7
7	42.6
8	39.5
9	37.9
10	36.2

**Tab. 5d.** Beobachtetes Überleben ab erster Progression für Patienten mit Diff. großzell. B-Zell-Lymphom im Zeitraum 1998-2020 (N=425).



**Abb. 5e.** Beobachtetes Überleben ab erster Progression (Alle Progredienten) für 534 Patienten mit Diff. großzell. B-Zell-Lymphom aus den Diagnosejahrgängen 1988 bis 2020 nach Zeitraum Progression.

Jahre	Zeitraum Progression		
	1988-1997 n=89 %	1998-2006 n=151 %	ab 2007 n=294 %
0	100.0	100.0	100.0
1	53.9	69.5	70.5
2	38.2	59.9	58.7
3	30.3	54.5	53.5
4	25.8	51.1	50.8
5	24.7	49.0	45.8
6	23.6	44.3	42.6
7		42.9	39.9
8		38.6	37.7
9		37.1	36.1
10		34.9	35.2

**Tab. 5f.** Beobachtetes Überleben ab erster Progression (Alle Progredienten) für Patienten mit Diff. großzell. B-Zell-Lymphom im Zeitraum 1988-2020 nach Zeitraum Progression (N=534).

**Abkürzungen**

TRM	Tumorregister München	
NCI	National Cancer Institute, USA	
SEER	Surveillance, Epidemiology, and End Results, USA	
UICC	Union for International Cancer Control, Genf	
DCO	Death certificate only	Diagnose ausschließlich aus Todesbescheinigung bekannt
k.A.	Keine Angabe	
o.n.A.	Ohne nähere Angabe	
OS	Overall/Observed Survival	Gesamtüberleben/beobachtetes Überleben (Kaplan-Meier-Schätzer) Beginn: Erstdiagnose Ereignis: Tod (alle Ursachen)
RS	Relative Survival	Relatives Überleben, relativ zur „Normalbevölkerung“, Quotient aus beobachtetem und zu erwartendem Überleben (Ederer II-Methode), Schätzung für das tumorspezifische Überleben
AS	Assembled Survival	Zusammengesetzte Darstellung des beobachteten, erwarteten, relativen Überlebens
CS	Conditional Survival	Konditionales Survival Überlebenswahrscheinlichkeit unter der Bedingung, einen bestimmten Zeitraum überlebt zu haben
TTP	Time to Progression	Zeit bis erste Progression Beginn: Erstdiagnose Ereignis (Progression): erste(s) Lokal-, Lymphknotenrezidiv, Metastase oder unspezifische Progression
1-KM		1 minus Kaplan-Meier-Schätzer („umgekehrter“ Kaplan-Meier-Schätzer)
CI		Kumulative Inzidenz Tod als konkurrierendes Ereignis (nach Kalbfleisch und Prentice)
PPS	Post-Progression Survival	Überleben ab erster Progression (Kaplan-Meier-Schätzer) Beginn (Progression): erste(s) Lokal-, Lymphknotenrezidiv, Metastase oder unspezifische Progression Ereignis: Tod (alle Ursachen)

**Empfohlene Zitierweise**

Tumorregister München. Überleben ICD-10 C83.3: Diff. großzell. B-Zell-Lymphom [Internet]. 2024 [aktualisiert 23.07.2024]. Abrufbar von: [https://www.tumorregister-muenchen.de/facts/surv/sC833\\_G-ICD-10-C83.3-Diff.-grosszell.-B-Zell-Lymphom-Survival.pdf](https://www.tumorregister-muenchen.de/facts/surv/sC833_G-ICD-10-C83.3-Diff.-grosszell.-B-Zell-Lymphom-Survival.pdf)

**Autorenrechte**

Der Zugang zu den vom Tumorregister München im offenen Internet bereitgestellten Inhalten ist weltweit verfügbar und kostenfrei. Die Dokumente dürfen unter Benennung der Urheberschaft frei heruntergeladen, genutzt, kopiert, gedruckt oder verteilt werden.

**Haftungsausschluss**

Das Tumorregister München übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der im Internet bereitgestellten Inhalte.